

Graviditet udenfor livmoderen

Hvad er en graviditet uden for livmoderen?

Ved en graviditet udenfor livmoderen har det befrugtede æg sat sig fast et andet sted end i livmoderhulen. 95% sidder i én af æggeledderne.

Risikoen for at blive gravid udenfor livmoderen er øget, hvis én eller begge dine æggeledere er helt eller delvist lukkede. Dette kan fx ses efter tidligere operationer, infektioner i underlivet og/ eller ved sygdommen endometriose. Hvis du bliver gravid med spiral, er risikoen ligeledes øget.

Hvordan er forløbet?

Da en tidlig graviditet udenfor livmoderen ikke altid kan ses med ultralyd, vil denne undersøgelse blive kombineret med blodprøver, hvor graviditetshormonet hCG måles over flere gange med et par dages interval. En graviditet udenfor livmoderen kan ikke gennemføres. I nogle tilfælde vil graviditeten gå i stå af sig selv, men i andre vil den videreudvikle sig. Man kan derfor opleve de almindelige symptomer på graviditet.

Nogle kvinder kan have blødning svarende til menstruation og tolke dette, som om de ikke var gravide. På et tidspunkt vil æggelederen briste og/ eller graviditetsvævet begynde at bløde, og der kan komme smerter i maven evt smerter i skulderen og ned mod endetarmen samt du kan blive svimmel og utilpas.

Forholdsregler:

Ofte gives patienten smerte –og blødningsvarsel. Det betyder, at blødning kan blive kraftig og medføre smerter og utilpashed.

Det er en potentiel farlig tilstand, som kræver hurtig behandling på et sygehus. Du skal derfor kontakte læge med det samme, såfremt du oplever smerter, kraftig blødning, bliver utilpas. Udenfor klinikkens åbningstid kan du kontakte:

Vagtlæge: 70150700

Akut hjælp: 112