

Kønsvorter

Kønsvorter kaldes også kondylomer. Det er en seksuelt overført sygdom og skyldes humant papillomavirus (HPV). HPV stimulerer hudens overfladeceller til at dele sig, og dermed opstår vorter som fortykkelser i huden.

Man kan godt smitte med HPV, selvom man ikke har nogen kønsvorter

Kondomer beskytter til en vis grad imod kønsvorter, men kun der hvor kondomet dækker.

HPV-vaccination (Gardasil) beskytter imod Kondylomer, hvis du ikke har fået Kondylomer endnu.

Symptomer

Kønsvorter er stilkede eller blomkålslignende vorter, som er placeret på området omkring de ydre kønsdele eller endetarmen. Kønsvorterne kan også findes i endetarmen, i urinrøret, skeden eller på livmoderhalsen.

Indvendige kondylomer ses ved gynækologisk undersøgelse eller ved anoskopi, som er en undersøgelse, hvor man fører et lille stift rør (skop) ind i endetarmen. Også celleprøve fra livmoderhalsen ("smear") kan påvise infektion med HPV.

Du kan forebygge kønsvorter ved at bruge kondom ved samleje. Men virus smitter ved tæt hud-mod-hud kontakt, og kan derfor også smitte uden for kondomets beskyttelse.

Behandling

Alle behandlinger giver bivirkninger i form af hudirritation og let sår dannelse. Hjælper en given behandling ikke, må der skiftes til en af de andre behandlinger. Uanset, hvilken behandling man vælger, vil der være stor risiko for, at de kommer tilbage efter uger og måneder.

Lokal behandling

Du kan pensle med Codyline og Wartec morgen og aften i 3 dage. Derefter skal man holdes pause i 4 dage, og så eventuelt gentage behandlingen. Podofyllin kan også påsmøres af lægen 1-2 gange ugentligt i op til 6 uger. Skal afvaskes i starten 1-9 timer efter påsmøring. Må ikke bruges til gravide.

Aldara påsmøres x 1 dagligt ved sengetid 3-5 gange ugentligt og afvaskes om morgenen, højst i 16 uger. Præparatet kan svække kondomer og pessar, og seksuel kontakt anbefales ikke, mens cremen er på huden. Må ikke bruges til gravide.

Anden behandling

Store kønvorter og kønvorter, som er vanskelige at behandle, kan enten fryses (kryobehandling), klippes eller brændes væk.

Kirurgisk operation eller en laserbehandling i lokal eller fuld bedøvelse kan blive nødvendig og denne behandling foretages på hospital. Disse metoder kan anvendes af gravide.

Partnerbehandling

Hvis din partner har Kondylomer skal han/hun også behandles. Din nuværende partner behøver ikke at være dén, som har smittet dig. Selve smittebæreren behøver ikke at have haft synlige kønvorter selv.