

Medicinsk behandling ved "Missed Abortion"

Medicinsk behandling af "Missed Abortion" kan foregå i speciallægepraksis frem til udgangen af 7. graviditetsuge.

Hvis du er under 18 år kræver loven, at en forælder eller en værge giver samtykke til indgrebet.

Forundersøgelse

Ved undersøgelsen vurderes det ved en ultralydsscanning af livmoderen, hvor langt du er henne.

Du vil blive orienteret om fordele og ulemper ved henholdsvis medicinsk og kirurgisk behandling. Hvis du vælger medicinsk behandling, vil forløbet blive grundigt gennemgået.

Behandlingen

Den nødvendige medicin vil blive udleveret i klinikken.

Du skal oplægge 4 tabletter Cytotec så højt som muligt i skeden. Det er vigtigt, at du ligger ned den næste lille times tid, så tabletterne ikke falder ud, og virkningen dermed udebliver. Denne medicin vil få livmoderen til at trække sig sammen, og du vil få blødning indenfor de næste par døgn. Blødningen kan være kraftig og smertefuld. Derfor er det **vigtigt, at der er nogen hos dig**, som kan støtte og hjælpe dig det første døgn tid.

Samtidig med oplægningen af Cytotec kan du tage 2 tabletter Panodil (1000 mg) og 3 tabletter Ipren (600 mg) for at forebygge de ofte ve-agtige og kraftige smerter, som kan forekomme, når livmoderen trækker sig sammen. Denne smertestillende behandling kan du tage i alt 3 gange i døgnet.

Medicinen kan købes i håndkøb – dvs. uden recept.

Komplikationer

Blødningen kan være kraftig og klumpet. Bløder du meget kraftigt i mere end 4-5 timer uden tegn til at det holder op, bør du kontakte klinikken på mobil 21664004 eller lægevagten/skadestuen. Blødningen vil normalt gradvist aftage i løbet af nogle dage og vil oftest være ophørt efter 2-3 uger.

Hvis ikke du får blødning efter oplægning af Cytotec tabletter, bør du også kontakte klinikken.

Hos ca. 5 % lykkes behandlingen ikke, og det vil være nødvendigt med en udskrabning. Infektion efter medicinsk abort er sjælden (ca.- 1-2 %).

Kontrol

Du vil få tid til kontrol med ultralydsscanning af livmoderen efter 10-14 dage for at sikre, at livmoderen har tømt sig efter behandlingen. Er dette ikke tilfældet kan det

være nødvendigt med en ny behandling med Cytotec, evt. en udskrabning afhængigt af forløbet og fund ved ultralydsscanningen.

Du frarådes brug af tampon, karbad/havbad, svømmehal og samleje, så længe du bløder.

I tvivlstilfælde kan du kontakte klinikken på mobil 2166404 eller Vibeke Hartvig på privat mobil 42430125. Efter kl. 22 må du kontakte lægevagten.