

Udredning for barnløshed

I klinikken undersøges både par og enlige for barnløshed.

Kvinden vil blive udredt for, om der er en normal cyklus med ægløsning, og der vil blive taget en række blodprøver. Desuden foretages en undersøgelse (HSU) for at sikre, at der er passage igennem æggeledeerne.

HSU (Undersøgelse af passage i æggeledeerne)

Indgrebet

Livmoderhalsen afvaskes med Klorhexidin og der lægges et tyndt kateter op i livmoderhulen. Kateteret holdes på plads af en meget lille ballon, der fyldes med luft. Samtidig med ultralydsskanning sprøjtes væske ind i livmoderhulen, så der fås et billede af, hvordan livmoderhulen og æggeledeerne fyldes. Man kan derved se, om der er passage gennem æggeledeerne. Herefter fjernes kateteret igen. Undersøgelsen varer ca. 10 minutter.

Efter indgrebet

Undersøgelsen kan være forbundet med menstruationslignende smerter i livmoderen og lidt mælkent udflåd i timerne efter.

Manden vil få taget blodprøver og blive henvist til sædanalyse på Fertilitetsklinikken i Køge. Såfremt sædkvaliteten er svært nedsat, skal der ofte henvises til yderligere undersøgelser.

Hvis et par har forsøgt at opnå graviditet gennem et halvt til 1 år (afhængig af kvindes alder), eller hvis der er en oplagt forklaring på barnløsheden, vil jeg henvise til fertilitetsbehandling på en offentlig klinik. Der vil være nogle obligatoriske blodprøver (HIV og Hepatitis B+C), som skal tages i forbindelse med henvisningen.