

## Udredning for barnløshed

I klinikken undersøges både par og enlige for barnløshed.

### **Kvinden**

Du vil blive udredt for, om der er en normal cyklus med ægløsning, og der vil blive taget en række blodprøver. Desuden foretages en undersøgelse (HSU) for at sikre, at der er passage igennem æggeledeerne.

### **HSU (Undersøgelse af passage i æggeledeerne)**

#### **Indgrebet**

Livmoderhalsen afvaskes med Klorhexidin og der lægges et tyndt kateter op i livmoderhulen. Kateteret holdes på plads af en meget lille ballon, der fyldes med luft. Samtidig med ultralydsskanning sprøjtes væske ind i livmoderhulen, så der fås et billede af, hvordan livmoderhulen og æggeledeerne fyldes. Man kan derved se, om der er passage gennem æggeledeerne. Herefter fjernes kateteret igen. Undersøgelsen varer ca. 10 minutter.

#### **Efter indgrebet**

Undersøgelsen kan være forbundet med menstruationslignende smerter i livmoderen og lidt mælked udflåd i timerne efter.

### **Manden**

Du vil få taget blodprøver og blive henvist til sædanalyse på Fertilitetsklinikken i Køge. Såfremt sædkvaliteten er svært nedsat, skal der ofte henvises til yderligere undersøgelser.

For jer begge vil der være nogle obligatoriske blodprøver (HIV og Hepatitis B+C), som skal tages i forbindelse med udredningen.

Når udredningen er gjort kan I enten tilbydes inseminationsbehandling her i klinikken eller jeg vil henvise til IVF-behandling på en offentlig klinik.

Typen af behandlingstilbud vil afhænge af resultaterne af undersøgelserne.